



健診・予防接種



健康な毎日を楽しく過ごすためにも、健診や予防接種を受けましょう。(問い合わせ 健康推進課 健康づくり係 58-1006)

4か月・10か月児健診は
同時開催です。

健康診査

赤ちゃんの成長確認や育児についてさまざまなアドバイスがもらえる場です。

4か月児健診

受診
日付

主な項目

身体計測・保健相談・内科診察・
離乳食教室・ふれあい遊び

/

10か月児健診

受診
日付

主な項目

身体計測・ふれあい遊び・ブ
ックスタート・聴力検査・保健相
談・歯のお話・内科診察・離乳食
教室

/

1歳6か月児健診

受診
日付

主な項目

身体計測・みんなで遊ぼう・栄養
のお話・保健相談・栄養相談・
内科診察・歯科指導・歯科健診
(フッ素塗布)

/

2歳6か月児健診

受診
日付

主な項目

身体計測・栄養のお話・保健相
談・栄養相談・内科診察・歯科指
導・歯科健診(フッ素塗布)

/

3歳6か月児健診

受診
日付

主な項目

身体計測・視力検査・尿検査・さ
さやき声検査・保健相談・栄養相
談・内科診察・歯科指導・歯科健
診(フッ素塗布)

/

場 所

保健センター

持 ち 物

母子健康手帳

質問票

食生活質問票

(10か月児健診のみ)

聴力検査票

(3歳6か月児健診のみ)

定期予防接種の種類・対象・接種間隔

全て医療機関での接種です！

種類	対象	接種開始年齢	接種間隔
ヒブ (Hib)	※接種開始年齢によって接種回数異なります。	生後2ヶ月～7ヶ月未満 (合計4回)	初回 27日(医師が認める場合は20日)以上あけて3回。 (標準:27～56日) ※2回目・3回目は1歳未満までに終了させる。超えた場合は行わない。(追加接種は可)
			追加 初回接種終了後7ヶ月以上あけて1回。 (標準:7～13ヶ月) ※初回の2回目・3回目が1歳未満までに終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は初回の最後の接種終了後27日(医師が認める場合は20日)以上あけて1回。
		生後7ヶ月～1歳未満 (合計3回)	初回 27日(医師が認める場合は20日)以上あけて2回。 (標準:27～56日) ※2回目は1歳未満までに終了させる。超えた場合は行わない。(追加接種は可)
			追加 初回接種終了後7ヶ月以上あけて1回。 (標準:7～13ヶ月) ※初回の2回目が1歳未満までに終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は初回の1回目終了後27日(医師が認める場合は20日)以上あけて1回。
		1～5歳未満 (合計1回)	1回接種。
小児用肺炎球菌	※接種開始年齢によって接種回数異なります。	生後2ヶ月～5歳未満 (合計4回)	初回 27日以上あけて3回。 ※2回目・3回目は2歳未満(標準:1歳未満)までに終了させる。超えた場合は行わない。(追加接種は可) ※また、2回目が1歳を超えた場合は3回目は行わない。(追加接種は可)
			追加 初回接種終了後60日以上あけて1歳以降に1回。 (標準:1歳～1歳3ヶ月未満)
		生後7ヶ月～1歳未満 (合計3回)	初回 27日以上あけて2回。 ※2回目は2歳未満(標準:1歳1ヶ月未満)までに終了させる。超えた場合は行わない。(追加接種は可)
			追加 初回接種終了後60日以上あけて1歳以降に1回。
		2～5歳未満 (合計3回)	1回接種。
B型肝炎	1歳未満	生後2ヶ月～8ヶ月 (合計3回)	27日以上の間隔を置いて2回接種した後、第1回目の注射から139日以上の間隔を置いて1回接種。
4種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)	生後3ヶ月～7歳6ヶ月未満 (標準:生後3ヶ月～1歳未満) (合計4回)	1期 初回	20日以上あけて3回接種。(標準:20～56日)
		1期 追加	1期初回の3回目接種後、6ヶ月以上に1回。 (標準:1年～1年半後)
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	11～13歳未満 (標準:小学6年生)		2期 4種混合の追加接種(2期)として、1回接種。
BCG	1歳未満 (標準:生後5～8ヶ月)		1回接種。 ※新生児の結核は重症化しやすいため、主治医と相談のうえ、早めに接種しましょう。
水痘	1～3歳未満		3ヶ月以上の間隔をあけて2回接種。 (標準:1歳～1歳3ヶ月未満に初回接種1回、初回接種終了後6ヶ月～1年未満に追加接種1回)
麻しん・風しん混合(MR)	1期:1～2歳未満 2期:5～7歳未満 (幼稚園年長相当)	1期	1回接種。
		2期	1回接種。
日本脳炎	1期: 生後6ヶ月～7歳6ヶ月未満 (合計3回)	標準:3歳	1期 初回 6日以上あけて2回接種。(標準:6～28日)
		標準:4歳	1期 追加 初回接種終了後、6ヶ月以上あけて1回接種。 (標準:概ね1年)
	2期:9～13歳未満 (標準:小学4年生)		1回接種。
子宮頸がん予防ワクチン	小学6年生～高校1年生相当年齢の女子 (標準:中学1年生) (合計3回) ※同一のワクチンを3回続けて接種。		2価ワクチン (16・18型) (サーバリックス)
			4価ワクチン (6・11・16・18型) (ガーダシル)
			2回目:1回目の接種から1ヶ月以上。 3回目:1回目の接種から5ヶ月以上、かつ2回目の接種から2ヶ月半以上。 (標準:1回目の接種から1ヶ月・6ヶ月ごと) 2回目:1回目の接種から1ヶ月以上。 3回目:2回目の接種から3ヶ月以上。 (標準:1回目の接種から2ヶ月・6ヶ月ごと)